



SOINS ET PRÉCAUTIONS POST-OPÉRATOIRES

Chirurgie de la parotide

Madame, Monsieur, vous venez de sortir d'hospitalisation pour chirurgie de la glande parotide. Afin d'éviter certaines complications post-opératoires, certaines précautions sont nécessaires.

DEPART DE LA CLINIQUE - RETOUR AU DOMICILE

- Suite à l'intervention, il est préférable de rester au calme.
- Eviter les efforts physiques.

SUITES OPERATOIRES

- Il est habituel dans les suites opératoires de ressentir une douleur ou une gêne de la région opérée.
- Les douleurs postopératoires sont normalement contrôlées par le traitement qui vous a été prescrit à la sortie, si elles persistent ou résistent au traitement, contactez le secrétariat ou le service d'hospitalisation.
- Un pansement aura été le plus souvent fait à la sortie. Si celui-ci ne tient plus, des soins infirmiers vous ont été prescrits ou des consignes locales recommandées. Sachez que la cicatrice peut être laissée à l'air.
- Eviter de mouiller la cicatrice jusqu'à la cicatrisation complète.
- Il n'y a pas de restrictions alimentaires, cependant, des douleurs peuvent être présentes à la mastication les premiers jours et vous feront alors préférer une alimentation plutôt molle.

COMPLICATIONS POST OPERATOIRES

- Comme toute chirurgie, un écoulement, un abcès, ou une désunion de la cicatrice peut survenir et doit vous conduire à contacter votre chirurgien rapidement.
- Un gonflement important et douloureux de la région opérée peut-être lié à un hématome ou un kyste salivaire et doit vous conduire à contacter votre chirurgien rapidement.
- Si une paralysie faciale a été constatée avant votre sortie, elle ne doit pas s'aggraver.
- Si une paralysie faciale survient après votre sortie contactez votre chirurgien rapidement

EN CAS DE DOUTE ou d'ANOMALIE

- Contactez votre médecin traitant
- Contactez le secrétariat : **05.59.46.46.46.**